



جمعية صندوق إغاثة المرضى
Patients Helping Fund Society



وزارة الصحة

جدول التطعيمات الأساسية لدولة الكويت

(وفق القرار الوزاري رقم 46 لعام 2017م)

طريقة الإعطاء	نوع الطعم	السن عند التطعيم
❖ في عضلة الكتف ❖ في عضلة الكتف	❖ جرعتان من طعم التيتانوس عند الشهر الخامس والسابع من الحمل الأول ❖ جرعة من طعم التيتانوس عند كل حمل قادم	الحوامل
❖ في عضلة الفخذ	❖ الجرعة الأولى من طعم الالتهاب الكبدى ب	خلال ٢٤ ساعة من الولادة (حديثي الولادة)
❖ في عضلة الفخذ ❖ في عضلة الفخذ ❖ في عضلة الفخذ ❖ بالضم	❖ الجرعة الأولى من طعم الشلل بالحقن (ثلاثي الفصيلة) ❖ الجرعة الأولى من الطعم الخماسي (ثلاثي يكتيري، هيوموفيلس، كبدى ب) ❖ الجرعة الأولى من طعم الالتهاب الرئوي ❖ الجرعة الأولى من طعم الروتا	نهاية الشهر الثاني
❖ داخل الجلد في الجزء العلوي الجانبي من الذراع الأيسر	❖ طعم الدرن (بي سي جي)	نهاية الشهر الثالث
❖ نقطتان بالضم ❖ في عضلة الفخذ ❖ في عضلة الفخذ ❖ بالضم	❖ الجرعة الأولى من طعم الشلل بالضم (ثنائي الفصيلة) ❖ الجرعة الثانية من الطعم الخماسي (ثلاثي يكتيري، هيوموفيلس، كبدى ب) ❖ الجرعة الثانية من طعم الالتهاب الرئوي ❖ الجرعة الثانية من طعم الروتا	نهاية الشهر الرابع
❖ نقطتان بالضم ❖ في عضلة الفخذ ❖ في عضلة الفخذ ❖ بالضم	❖ الجرعة الثانية من طعم الشلل بالضم (ثنائي الفصيلة) ❖ الجرعة الثالثة من الطعم الخماسي (ثلاثي يكتيري، هيوموفيلس، كبدى ب) ❖ الجرعة الثالثة من طعم الالتهاب الرئوي ❖ الجرعة الثالثة من طعم الروتا	نهاية الشهر السادس
❖ تحت الجلد في الذراع ❖ نقطتان بالضم ❖ تحت الجلد في الذراع	❖ الجرعة الأولى من طعم الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف ❖ الجرعة الثانية من طعم الشلل بالضم (ثنائي الفصيلة) ❖ الجرعة الأولى من طعم الجدري المائي	عند استكمال السنة الأولى من العمر
❖ نقطتان بالضم ❖ في عضلة الفخذ ❖ في عضلة الفخذ	❖ الجرعة الرابعة من طعم الشلل بالضم (ثنائي الفصيلة) ❖ جرعة منشطة من الطعم الخماسي ❖ جرعة منشطة من طعم الالتهاب الرئوي	عند عمر 18 شهر
❖ تحت الجلد في الذراع ❖ تحت الجلد في الذراع ❖ تحت الجلد في الذراع	❖ طعم الالتهاب السحاني رباعي الفصيلة (A, C, W135, Y) ❖ الجرعة الثانية من طعم الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف ❖ الجرعة الثانية من طعم الجدري المائي	عند استكمال السنتين من العمر
❖ نقطتان بالضم ❖ في العضل	❖ الجرعة الخامسة من طعم شلل الأطفال (ثنائي الفصيلة) ❖ جرعة منشطة من طعم الثلاثي البكتيري (دفتريرا - تيتانوس - سعال ديكى)	عند استكمال ثلاث سنوات ونصف من العمر
التأكد من حالة الطفل التطعيمية واستكمال التطعيمات الناقصة إن وجدت		من 4-6 سنوات (قبل دخول المدرسة)
❖ تحت الجلد في الذراع ❖ في العضلة الدالية بالذراع	❖ جرعة منشطة من طعم الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف (للبنات) ❖ جرعة منشطة من طعم الناناي البكتيري (دفتريرا - تيتانوس)	من 10 - 12 سنة (بالمدراس)
❖ في العضلة الدالية بالذراع	❖ جرعة منشطة من طعم الناناي (دفتريرا - تيتانوس)	من 16 - 18 سنة (بالمدراس)

❖ الطعم الخماسي يحتوي على : الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي والهيوموفيلس انفلونزا والكبدى ب
❖ تُعطى جرعات الروتا وفقاً لنوع الطعم المستخدم بواقع ٢ أو ٣ جرعات وفقاً للشركة المنتجة

طبعت بدعم من جمعية صندوق إغاثة المرضى

www.phf.org.kw